

Inname van laxeremiddelen (macrogol/elektrolyten of magnesiumhydroxide) en van extra pijnmedicatie in OMAMA-onderzoek

Studienummer:

Toelichting

Zet een kruisje bij het laxeremiddel dat u gebruikt.

Vul iedere keer in de tabel in als u het laxeremiddel heeft ingenomen. Vergeet niet om iedere dag de datum in te vullen. Dag 1 is de eerste dag dat u het laxeremiddel gebruikt.

Als u het middel maar 1x per dag gebruikt zal dat meestal 's morgens zijn, maar het kan ook 's middags of 's avonds. Geef aan of u 1 of 2 (of eventueel meer) zakjes of tabletten per keer gebruikt. Als u vergeten bent om het laxeremiddel in te nemen, laat u het vakje leeg.

Vul daarnaast in de laatste kolom in of u extra pijnmedicatie heeft ingenomen. Geef aan hoeveel tabletten van de extra pijnmedicatie u op die dag heeft ingenomen. Als u geen extra pijnmedicatie heeft ingenomen op een dag, laat u het vakje leeg.

Ik gebruik:

- Macrogol/elektrolyten (zakjes, opgelost in water)
- Magnesiumhydroxide (tabletten)

Dag	Datum	Ochtend	Middag	Avond	Extra pijnmedicatie
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

11					
12					
13					
14					